



بیمارستان امام خمینی بناب

گل مژه (شالازیون)



تهیه کنندگان:

با راهنمایی آقای دکتر صبوری

هاجر بیرامی (آموزش سلامت)

شمسی اسفندبازی (سرپرستار)

تاریخ تدوین: ۱۴۰۰

ویرایش: دوم

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴

کد سند: ۳۳-PA-PHE

تعریف گل مژه:

عفونت اطراف ریشه مژه است. گل مژه شبیه جوش یا دمل است ممکن است در هر بار ابتلا بیش از یک گل مژه ایجاد شود یا فرد به طور مکرر به آن مبتلا گردد. چون باکتری هایی که در ابتدا یک فولیکول مو را عفونی کرده اند می توانند پخش شده و سایر مژه ها را نیز مبتلا کنند.

معمولا گل مژه به تدریج ایجاد می شود و توده قرمز دردناکی پدید می آورد. سر انجام، توده با چرک پر شده و می ترکد. با آزاد شدن چرک، درد تسکین یافته و معمولا پس از چند روز گل مژه ناپدید می شود.

شکل دیگری از ورم پلک شالازیون نامیده می شود برخلاف گل مژه نسبتا بدون درد است شالازیون به علت انسداد یکی از غدد کوچکی که کار تولید بخشی از لایه اشکی را به عهده دارد ایجاد می شود.

گاهی باکتریها در داخل این غدد مسدود، رشد می کنند. شالازیون نسبت به گل مژه کمی عمقی تر بوده و دورتر از لبه پلک است.

اغلب شالازیون ناراحتی کمتری ایجاد می کند، اما ممکن است بد شکل و ناخوشایند باشد

درمان گل مژه و شالازیون:

گل مژه و توده های پلک تقریبا همیشه برای چشم و بینایی بی ضررند اما اگر گل مژه ای با بینایی شما تداخل پیدا کند و یا از بین نرود یا اگر به طور مکرر به آن مبتلا می شوید به چشم پزشک مراجعه کنید برای درمان گل مژه، یک پانسمان فشاری گرم را، چهار بار در روز هر بار به مدت ۱۰ دقیقه روی آن قرار دهید. برای تهیه این پانسمان، پارچه تمیزی را در آب گرم خیس کرده و قبل از گذاشتن روی چشم، آب آنرا بگیرید.



در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با رابط آموزشی
بخش جراحی تماس بگیرید:

۰۴۱۳۷۷۶۹۹۲۷

منابع: داخلی - جراحی برونر سودارث

با آرزوی سلامتی و بهبودی برای شما مددجوی عزیز



منظور خارج کردن چرک، فشار ندهید. اجازه دهید
خودش باز شود. گل مژه های بیش از حد مقاوم، به برش
ظریف و تخلیه نیاز دارند.

شالازیون معمولاً بدون درمان، در خلال یک یا دو ماه
ناپدید می شود. بکار بردن پانسمان فشاری گرم، بهبود را
تسریع می کند. ممکن است پزشک یک پماد آنتی
بیوتیک تجویز کند. اگر این روشها موثر نباشند یا اگر
شالازیون همچنان به رشد خود ادامه بدهد می توان با
جراحی آنرا برداشت. بعد از عمل چشم معمولاً به مدت
چند ساعت با پانسمان پوشیده می شود. اگر گل مژه
همچنان متورم باقی بماند یا به عفونتهای مکرر دچار
شوید احتمالاً پزشک آنتی بیوتیک خوراکی یا پماد
آنرا برای استفاده روی پلک تجویز خواهد کرد.

منبع: برونر سودارث داخلی - جراحی