

## نحوه تزریق

به صورت وریدی وزیر جلدی توسط پرستار دیالیز تزریق میشود.



حمل اپرکس از داروخانه به منزل:

۱- از قرار دادن در مجاورت نور خورشید مقابل پنجره اتومبیل خودداری کنید.

۲- از تکان دادن شدید اپرکس جدا خودداری فرمایید.

طریقه نگهداری اپرکس در منزل:

در یخچال در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد در قفسه نگهداری کنید.

از قرار دادن اپرکس در فریزر خودداری کنید.

## اپرکس

دارویی برای جبران کم خونی در بیماران دیالیزی مصرف میشود.

## شکل دارو:



## بسته بندی:

سرنگ های آماده تزریق ۲۰۰۰، ۴۰۰۰، ۱۰۰۰۰ واحد در ۰/۵ میلی لیتر،

## تعداد دفعات مصرف:

هفته ای ۱-۳ بار



بیمارستان امام خمینی بناب

# آمپول اریتروپوئیتین

(اپرکس)

تهیه کنندگان:

سوپروایزر آموزشی سلامت: خانم بیرامی

رابط آموزشی: خانم سلیمانزاده

با تایید: دکتر طالعی

تدوین: ۱۴۰۰

ویرایش: اول

بازنگری: ۱۴۰۳

کد PA-PHE-17

منابع:

[www.cinnagen.com](http://www.cinnagen.com)

[sums.ac.ir](http://sums.ac.ir)

کتاب پرستار و دیالیز.

شماره بخش دیالیز در صورت هر گونه سوال بیماران عزیز

۰۴۱۳۷۷۶۴۷۷۷

در صورت وجود یکی از اختلالات زیر از دارو استفاده نکنید.

۱- کدورت یا رنگی شدن دارو

۲- مشاهده ذرات معلق و کف

۳- خاموش شدن طولانی مدت یخچال در اثر قطع برق

۴- یخ زدن دارو و یا گرم شدن در اثر حرارت بیش از ۲۵ درجه سانتی گراد.

### نکات مهم در تزریق دارو

۱- فشار خون باید کنترل شود و بالای ۱۶۰ نباشد

۲- دارو به صورت یکبار مصرف می باشد باقی مانده باید دور انداخته شود.

۳- محل تزریق در بازوها و شکم می باشد و مرتب باید محل تغییر کند.

۴- در پوست محل تزریق درد ایجاد میشود.

۵- در صورت حساسیت به اپرکس نباید تزریق شود.

زمانی که دارو را استفاده نکرده اید در درون جعبه در یخچال نگه دارید.

### آماده سازی اپرکس جهت تزریق:

بعد از خارج کردن از یخچال توجه کنید تاریخ مصرف ان گذشته باشد.

صبر کنید دمای دارو با دمای اتاق یکسان باشد.

از گرم کردن سریع اپرکس خودداری کنید.

گرم کردن اپرکس به وسیله مالش بین دو کف دست خودداری کنید.

گرم کردن اپرکس در ماکروفر .یا زیر آب گرم خودداری کنید.