




بیمارستان امام خمینی بناب

گرافت عروق و مراقبت از آن

در بیماران دیالیز



تهیه کننده: بکران (رابط آموزش دیالیز)

گروه هدف: بیماران دیالیز

تدوین: ۱۴۰۰

بازنگری: ۱۴۰۲


کد سند: PA-PHE-21

گرافت های عروقی

گرافت یک رگ مصنوعی است که به علت نداشتن رگ مناسب به جای فیستول جهت دیالیز توسط جراح گذاشته می شود. گرافت شریانی - وریدی را (کورتکس) می نامند.

گرافت ۴ تا ۸ میلی متر زیر پوست (به شکل مستقیم یا حلقوی) قرار میگیرد.

با استفاده از یک رگ مصنوعی (لوله مصنوعی) برای اتصال ورید (سیاهرگ) و شریان (سرخرگ) انجام می شود. جنس اغلب گرافت های بیشتر از پلیتترافلوروانیلن است و بر خلاف فیستول، دارای طول های مختلفی می باشد. اما گرافت، به دلیل وجود یک جسم خارجی درون بافت بدن، خطر بیشتری از نظر ایجاد عفونت در بدن دارد.



گرافت را در چه محل هایی قرار می دهند

گرافت مستقیم ساعد، گرافت حلقوی یا گرافت مستقیم بازو

اولویت اول با گرافت اندام فوقانی میباشد و گرافت اندام تحتانی با توجه به احتمال بیشتر عفونت و ایسکمی اندام در اولویت دوم قرار دارد

عوارض

ترومبوز

میزان ترومبوز یا لخته نیاز به ترومبکتومی در گرافت صنایع حدود ۴ برابر بیشتر از فیستول شریانی - وریدی میباشد.

عفونت

درمان عفونت گرافت صنایع مشکلتر میباشد. در موارد علائم موضعی عفونت بدون وجود سینوس یا ترشح چرکی و عدم وجود باکتری، توصیه به آنتی بیوتیک تزریقی میگردد بخصوص در مواردی که بدنبال عمل جراحی کارگذاری یا عمل جراحی مجدد بر روی دسترس عروقی ایجاد میگردد. درمان آنتی بیوتیکی حداقل بمدت ۲ هفته توصیه میشود

سروما

تجمع مایع غیرعفونی در اطراف گرافت بعلت هماتوم، لنفوسل و یا سروما میباشد. هماتوم کوچک و لنفوسل معمولاً بدون اقدام درمانی و به مرور زمان برطرف میگردد ولی سروما معمولاً نیاز به دخالت جراحی دارد

ایسکمی

پدیده شایع پس از عمل جراحی فیستول شریانی - وریدی و گرافت صنایع میباشد

چگونه از پیوند یا گرافت خود مراقبت کنیم؟

هیچگاه اجازه ندهید از عضوی که گرافت گذاشته شده فشار خون گرفته شود

هیچگاه اجازه ندهید از عضوی که گرافت گذاشته شده هیچگونه تزریقی انجام شود

روزانه ۴ بار محل گرافت خود را لمس و از کارایی آن اطوینان حاصل نمایید

روزانه نبض پا و دست را لمس کنید

بعد از جراحی عضوی را که گرافت شده بالا نگه دارید

روزانه عضو گرافت شده را حرکت و ورزش دهید

محل تزریق سوزن را از لحاظ خونریزی کنترل کنید

محل تزریق سوزن را از لحاظ خونریزی کنترل کنید

علائم و نشانه های عفونت محل سوزن (قرمزی، تورم و درد...) را کنترل کنید

به هیچ وجه با عضو گرافت شده وزنه سنگین بلند نکنید

روی عضو گرافت شده نخوابید

بعد از انجام دیالیز به مدت ۸ ساعت از دوش گرفتن و برداشتن پانسمان محل گرافت خودداری کنید

منابع : کتاب پرستار و دیالیز

تلفن بخش : ۰۴۱۳۷۷۶۴۷۷۷