

## درمان گل مژه و شالازیون:

گل مژه و توده های پلک تقریبا همیشه برای چشم و بینایی بی ضررنداما اگر گل مژه ای با بینایی شما تداخل پیدا کند و یا از بین نرودیا اگر به طور مکرر به ان مبتلا می شوید به چشم پزشک مراجعه کنیدبرای درمان گل مژه، یک پانسمان فشاری گرم را، چهار بار در روزه را در مدت ۱۰ دقیقه روی آن قرار دهید. برای تهیه این پانسمان، پارچه تمیزی را در آب گرم خیس کرده و قبل از گذاشتن روی چشم، آب آنرا بگیرید.



## تعریف گل مژه:

عفونت اطراف ریشه مژه است. گل مژه شبیه جوش یا دمل است ممکن است در هر بار ابتلا بیش از یک گل مژه ایجاد شود یا فرد به طور مکرر به آن ابتلا گردد. چون باکتری هایی که در ابتدا یک فولیکول مو را عفونی کرده اند می توانند پخش شده و سایر مژه ها را نیز مبتلا کنند.

معمولًا گل مژه به تدریج ایجاد می شود و توده قرمز در دنایک پدید می آورد. سرانجام، توده با چرک پرشده و می ترکد. با آزاد شدن چرک، درد تسکین یافته و معمولاً پس از چند روز گل مژه ناپدید می شود.

شكل دیگری از ورم پلک شالازیون نامیده می شود برخلاف گل مژه نسبتاً بدون درد است شالازیون به علت انسدادیکی از غدد کوچکی که کار تولید بخشی از لایه اشکی را به عهد هدارد ایجاد می شود.

گاهی باکتریها در داخل این غدد مسدود، رشد می کنند. شالازیون نسبت به گل مژه کمی عمقی تر بوده و دورتر از لبه پلک است.

اغلب شالازیون ناراحتی کمتری ایجاد می کند، اما ممکن است بد شکل و ناخوشایند باشد



بیمارستان امام خمینی بناب

بیمارستان امام خمینی بناب

# گل مژه(شالازیون)



تهیه کنندگان:

با راهنمایی آقای دکتر صبوری

هاجر بیرامی(آموزش سلامت)

شمسمی اسفندیاری(سرپرستار)

تاریخ تدوین: ۱۴۰۰

ویرایش: دوم

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳

کد سند: PA-PHE-۳۳

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با رابط آموزشی  
بخش جراحی تماس بگیرید:

۰۴۱۳۷۷۶۹۹۲۷

منابع: داخلی - جراحی بروнер سودارت

با آرزوی سلامتی و بهبودی برای شما مددجوی عزیز



منظور خارج کردن چرک، فشار ندهید. اجازه دهید  
خودش باز شود. گل مژه های بیش از حد مقاوم، به برش  
ظرفیت و تخلیه نیاز دارند.

شالازیون معمولاً بدون درمان، در خلال یک یا دو ماه  
ناپدید می شود. بکار بردن پانسمان فشاری گرم، بهبود را  
تسريع می کند. ممکن است پزشک یک پماد آنتی  
بیوتیک تجویز کند. اگر این روشها موثر نباشند یا اگر  
شالازیون همچنان به رشد خود ادامه بدهد می توان با  
جراحی آنرا برداشت. بعد از عمل چشم معمولاً به مدت  
چند ساعت با پانسمان پوشیده می شود. اگر گل مژه  
همچنان متورم باقی بماند یا به عفونتهای مکرر دچار  
شوید احتمالاً پزشک آنتی بیوتیک خوارکی یا پماد  
آنرا برای استفاده روی پلک تجویز خواهد کرد.

منبع: بروнер سودارت داخلی - جراحی