



تب مالت



تهیه و تنظیم

رئیس علمی بخش داخلی: دکتر طالعی

سوپروایزر آموزشی: بیرامی

سرپرستار بخش: ش - صمدزاده

رابط آموزشی: لیلا جلالی

تاریخ تدوین: ۱۴۰۰

ویرایش: دوم

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳

کد سند: ۱۲۲-PA-PHE


مقدمه

تب مالت: یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام محسوب می شود که طیف وسیعی از حیوانات اهلی و وحشی را درگیر می کند. از دو بعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه قرار می گیرد.

این بیماری در مناطقی که برنامه های کنترل بیماری در حیوانات به خوبی اجرا نمی شود، شیوع بالایی دارد.

تعریف بیماری تب مالت: یک بیماری باکتریایی است که در بین حیوانات مختلف عمدتاً علفخوار بوجود می آید. معمولاً منجر به سقط جنین آنها می شود.

راههای انتقال به انسان: از طریق تماس با جفت یا خون حیوان آلوده



از طریق

استفاده از فرآورده های حیوانات آلوده (شیر و خامه غیر پاستوریزه، پنیر تازه)

از راه تنفس بز، گاو، گوسفند و خوک چهار حیوان اهلی هستند که عموماً به این بیماری دچار شده و به عنوان مخزن بیماری باکتری را به انسان منتقل می کند

تأثیر بیماری تب مالت در حیوانات:

- موجب ابتلای جنین در دامهای آبستن

- موجب سقط جنین حیوانات

- موجب کاهش وزن حیوانات

- موجب کاهش شیر حیوانات به علت دفع باکتری توسط دامهای مبتلا مراتع و محل های نگهداری دام آلوده شده و دام های سالم را مبتلا می نماید و سبب شیوع بیماری می گردد.



تأثیر بیماری تب مالت در انسان

-باعث از کارافتادگی به مدت نسبتاً طولانی

-خسارت اقتصادی فراوان ناشی از تعطیلی کار

-هزینه درمان سنگین و گاه عوارض طولانی مدت در شخص مبتال علائم بیماری در انسان :تب، عرق شبانه، سردرد، کمر درد، درد مفاصل و عضالت، ضعف شدید، معمولاً صبحها حال بیمار نسبتاً خوب و عصرها دارای علائم می باشد.

البته مواردی از بیماری هم به صورت بدون علامت واضح وجود دارد. مشاغل در معرض خطر :کارگران کشاورزی، دامداران، دامپزشکان، کارگران کشتارگاه در مردان بیشتر از زنان می باشد .

راههای پیشگیری از تب مالت :

- در صورت مشاهده و سقط جنین در دام باید رعایت نکات ایمنی فرد بطور کامل باشد (استفاده از دستکش، ماسک، روپوش)

جنین سقط شده را باید سوزاند و بطور عمقی دفن کرد

- از فرآورده های حیوانی که سقط کرده نباید استفاده کرد

-مراتب را به دامپزشکی محل اطلاع داده در صورت مثبت بودن آن را به کشتارگاه فرستاد .

در صورت نبودن شیر پاستوریزه حداقل شیر را به مدت ۵ دقیقه جوشاند .

باید پنیر تازه حتماً ۳ ماه در آب نمک مانده و بعد مصرف گردد.

از مصرف بستنی سنتی و شیرینی خامه ای نامطمئن یا آب میوه های مخلوط به شیر به شدت خودداری نمود.

- ۸ واکسیناسیون به موقع بره و بزغاله، گوساله ها باعث کنترل بیماری در دام می باشد.



اقداماتی که باید برای فرد مبتلا انجام شود

-در صورت نگهداری دام بیمار باید مراتب به دامپزشکی محل جهت معاینه دامهای موجود اطلاع داده شود

-آموزش اطرافیان بیمار در مورد راههای انتقال و پیشگیری از بیماری،

نظارت بردرمان فرد مبتلا و پیشگیری آن به طوری که به صورت کامل انجام گردد

- بیمار یابی از موارد مشکوک به بیماری با علائم تب و لرز و عرق،

درد مفاصل، ورم مفاصل و ارجاع به مراکز بهداشتی و درمانی

- پزشک را باید از وضعیت جسمی مادر باردار یا شیرده مطلع نماییم

چرا که درمان بیماری با سایر افراد متفاوت می باشد

.منابع - :راهنمای کشوری تب مالت، دکتر محمد زینلی،

چاپ دوم، ۱۳۳۱ - .راهنمای تشخیص و درمان بروسلوز،

دکتر محمد شیرزاده -

شماره تماس بیمارستان

۰۴۱-۳۷۷۶۳۰۹۰

داخلی ۳۵۶