

سرطان



تهیه و تنظیم

رئیس علمی بخش داخلی: دکتر طالعی

سوپر واچر آموزشی: بیرامی

رابط آموزشی: رقیه سلیمانزاده

تاریخ تدوین: ۱۴۰۰

ویرایش: دوم

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳

تعريف:

به رشد و تکثیر بی رویه و خارج از کنترل تعدادی از سلولهای بدن سلطان گفته می‌شود. رشد غیر عادی و بیش از حد سلولهای بافت، تومور نامیده می‌شود که می‌تواند خوش خیم و یا بد خیم باشد. هر نوع سرطان عوامل، مشخصات و همچنین درمان خاص خود را دارد،

درمان های اصلی:

جراحی (برداشتن توده اصلی)

پرتو درمانی (تابش اشعه یونیزه به تومور و تخریب بافت تومور)

شیمی درمانی (دارو درمانی شیمیایی و تخریب تومور) و...

عارض :

باتوجه به روند بیماری و درمان شاید برخی عوارض در شما رویت گردد، نوع و شدت عوارض افرادی به فرد دیگر متفاوت می‌باشد

توصیه های مراقبتی در:

عفونت: -شستن مرتب دست ها و رعایت بهداشت فردی

-پرهیز از تماس با بیمارانی با بیماری های قابل سرایت

-پرهیز از آسیب یا خراشیدگی حین کار با قیچی، چاقو و...

-استفاده از ریش تراش بر قی به جای تیغ

تغذیه: از مصرف مایعات هم زمان با مصرف غذا و یک ساعت قبل و بعد از آن پرهیز کنید.

-خوردن و آشامیدن را به آرامی و بدون عجله انجام دهید.

-از غذاهای شیرین، سوخاری و چرب پرهیز نمایید.

-غذاها را در درجه حرارت اتاق و یا حتی سرد میل نمایید تا بوى آنها آزار دهنده نباشد.

-آبمیوه های طبیعی مانند آب انگور و آب سیب که به صورت تمیز تهیه شده اند، استفاده نمایید.

-آن ببات نعنایی و یا یک قطعه یخ در دهان گذاشته و بمکید

-از بوهای که موجب آزار شما می‌شوند (بوی غذا، عطر و...) پرهیز دید.

-بعد از صرف غذا روی صندلی استراحت کنید و تا دو ساعت از خوابیدن یا دراز کشیدن خودداری فرمائید.

-لباسهای راحت و گشاد بپوشید.

-زمانی که احساس تهوع داشتید نفس های عمیق و آرام بکشید.

-از مصرف غذاهای پرفیبر (نان جو، غلات، سبزیجات خام، میوه های تازه و خشک شده) که موجب اسهال می‌شوند، خودداری کنید و غذاهایی با فیبر کم (نان سفید، برنج سفید، موز رسیده، میوه جات شفته شده یا کمپوت بدون پوست، ماست، تخم مرغ، گوجه فرنگی پخته و یا له شده بدون پوست، پوره سبزیجات، مرغ یا بوقلمون بدون پوست و ماهی استفاده نمایید.

-غذار در حجم کم و دفعات زیاد مصرف کنید.

-در صورت عدم امکان بلع بامشورت پزشک لوله تغذیه و مواد غذایی پوره شده و سهل الهضم و... داده می‌شود.

هزینه درمان: اکثر بیمه ها درصدی از مخارج درمان را قبل می کنند. با این حال اگر در پرداخت هزینه هادچار مشکل باشید میتوانید باپزشک و پرستار خود صحبت نمایید. ممکن است در پیدا کردن نهادهای حمایتی یا ارجاع به مددکاری شمارا یاری نمایند.

- یادمان باشد همواره امیدوار بوده و از حمایت همه جانبی بیمار خود کوتاهی ننماییم.



منابع:

- برونو رو سودارت

www.cancerinfo.ir -

درد:- شما حق دارید بخواهید که در دلتان تسکین یابد.

- بهترین راه کنترل درد، پیشگیری از شیوع یاتشدید درد است.

- داروهای ضد درد سلطان به ندرت اعتیاد آور می باشد.

- بدن شما به داروهای ضد درد مقاوم نمی شود.

- استفاده از روش های دارویی و غیر دارویی جهت کنترل درد

روش های دارویی اصلی ترین روش می باشد شامل غیر مخدراها (ابیوبروفن و...) مخدراها (کدئین، مورفین و...) می باشد که با توجه به وضعیت بالینی و نظر پزشک تجویز می گردد.

روش های غیر دارویی شامل: تصورات ذهنی مثبت مثل تصور حضور در یک ساحل یا باغ مورد علاقه

- ورزش سبک و پیاده روی مختصرا باعث شل شدن عضله، و رفع خستگی و کاهش درد میگردد از مانند درستributor طولانی پرهیز کنید.

- ایجاد سرما و گرمای روی موضع درد بصورت پیچیده شده با پارچه نرم، به مدت کوتاه و متناوب مفید می باشد.

- ماساژ جریان خون را بیشتر کرده و به شل شدن عضله و کم شدن التهاب کمک میکند.

- حضور در گمی دوستان و آشنایان، تماشای موسیقی یا فیلم مورد علاقه میتواند باعث مشغولیت ذهنی شما گردد.

ریزش مو:- استفاده از شامپو ملاجم و برس نرم

- پرهیز از زنگ کردن و حرارت دادن به پوست مثلا با سشو ار

- تهیه کلاه گیس در صورت تمایل قبل از اقدام برای شیمی درمانی

- کوتاه کردن موها جهت پر پشت به نظر آمدن و نظافت راحت تر

- صحبت با درمانگر و بیان خشم و افسردگی میتواند کمک کننده باشد.



اثرات جنسی:- تمایلات جنسی و اثرات درمان در افراد مختلف، متفاوت است و اثرات عوارض درمان هامیتواند موقتی یادآئی باشد.

- توجه داشته باشید مشورت با منخصص زنان، و دریافت مشاوره های بارداری، قبل از شیمی درمانی و... جهت بهبود روابط زن و شوهر و باروری آنها مؤثر می باشد.