


توجه: با توجه به جدول زمان باز شدن بخیه، زمان کشیدن

بخیه ها حتماً باید با هماهنگی پزشک معالج تعیین شود



تغذیه

هر گونه کمبود در تغذیه ترمیم زخم را به تاخیر می اندازد برای تسریع بهبود زخم از چربی- پروتئین و کربوهیدارت ویتامین ها و مواد معدنی استفاده نمائید می توانید از گوشت تازه - تخم مرغ- لبیات شیر و ماست، میوه و سبزیجات تازه و مغز گردو استفاده نمائید.



نتنه:

زمان کشیده شدن بخیه ها به محل بخیه و واکنش بدن و دستور پزشک بستگی دارد نخ های بخیه جذبی بطور خود بخودی بعد از ۲ تا ۶ ماه در بافت بدن متلاشی و خود بخود از بین میروند. نخ های غیر جذبی نیاز به کشیدن بخیه دارند.

مددجوی گرامی جدول زیر کمک می کند
زمان باز شدن بخیه خود را بدانید.

کشیدن بخیه	محل زخم
۳ تا ۵ روز	صورت
۷ تا ۱۰ روز	پوست سر
۷ تا ۱۰ روز	اندام های فوقانی
۱۰ تا ۱۴ روز	اندام های تحتانی
۱۰ تا ۱۴ روز	تن
۱۴ تا ۲۱ روز	کف دست و پاها



بیمارستان امام خمینی بناب



مراقبت از بخیه

تهیه و تنظیم: خانم ستارزاده

رئیس علمی بخش: دکتر فضلی

سوپر وایزرا موزش سلامت: خانم بیرامی

تدوین: ۱۴۰۱

بازنگری: ۱۴۰۳

منابع: کتاب درسنامه پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارت، تالیف جانیس ال. هینکل، ترجمه حجی محمد نوروزی، انتشارات اندیشه رفیع

کد سند: PA-PHE-۹۲

بخیه: بخیه زدن بهترین روش برای ترمیم پارگی های پوست است در این روش از نخ مخصوص بخیه برای دوختن لب های یک زخم و نزدیک کردن آنها به هم استفاده می شود.

مددجوی گرامی ۳ هدف اصلی بخیه زدن را بدانیم:

۱- جلوگیری از خونریزی محل پارگی و پیشگیری از ایجاد عفونت در زخم

۲- باز گرداندن کارکرد بافت های اسید دیده

۳- دستیابی به نتایج زیبائی محل اسید دیده با به حداقل رساندن اسکار (مالندن جای زخم ترمیم شده)

نکات کلیدی مرابت از بخیه:

- محل بخیه شده را تمیز و خشک نگهدارید باید از زخم طوری مرابت شود که سه روز پس از بخیه با اجازه پزشک محل زخم شسته شود

توجه: مرطوب نگهداشتن زخم باعث باز شدن بخیه و عفونت موضع می شود
محل بخیه ها را یک روز در میان با استفاده از محلول نرمال سالین (سرم شستشو) ضد عفونی و بعد از خشک کردن مجدد پانسمان نمایید.



- مالیدن واژلين روی زخم استریل به اندازه استعمال پماد آنتی بیوتیک روی زخم در بهبود و التیام زخم موثر است.
توصیه می شود اگر محل بخیه شده در معرض آفات است از فساد آفات جهت کاهش به جاماندن جای زخم در محل استفاده شود.

مددجوی گرامی به هشدارها توجه کنید

- ۱- در صورت درد و تورم و قرمزی در اطراف بخیه و حتی خروج مایع زرد رنگ و غلیظ حساس پزشک را مطلع نمایید.
- ۲- تپ بالا یک علامت مهم و هشدار دهنده جهت پرور عفونت در محل بخیه می باشد.
- ۳- ممکن است نیاز به واکسیناسیون کراز داشته باشد که طبق دستور پزشک حتماً تزریق شود مگر در طی دو هفته اخیر آمپول کراز تزریق کرده باشد.
- ۴- در صورت تزریق واکسن، محل مورد نظر شاید قرمز و حساس به لمس باشد از این موضوع نگران نباشد در صورتیکه قادر به حرکت دادن مفصل زیر زخم نباشد پزشک را مطلع کنید.

توجه: حتی المقدور مواد ضد عفونی کننده نظیر بتادین و آب اکسیزنه در زخم های عادی استفاده نشود در زخم های عفونی هم با دستور پزشک و بعد از رفیق کردن محلول های فوق جهت شست و شوی پانسمان استفاده شود.

- مددجوی گرامی بهتر است برای اطمینان از درست بودن روش پانسمان به یک مرکز درمانی یا فردی مهرب مراجعت نمایید.

- اگر مسدوم کودک است به او توصیه شود از دستکاری زخم خوداری نماید.

- محل بخیه شده بهتر است جهت کاهش درد و تورم در سطح بالاتر از قلب فرار گیرد.

- در هنگام استراحت و خواب عضو بخیه شده را می توان با بالش بالانگه داشت.

- در هنگام درد می توان به دستور پزشک مسکن استفاده شود.

توجه: در کودکان به علت درد و تپ حتی المقدور از آسبرین استفاده نشود.