

- پروتیین های حیوانی زیاد-کمبود مصرف سبزیجات و فیبر-صرف زیادشکر) ۷- سلبقه خانوادگی مثبت ۸- افراد دارای یک کلیه ۹- فعالیت جسمانی کم و در بستر افتابان طولانی مدت به هر دلیل ۱۰- سوء مصرف الكل ۱۱- ابتلا به بیماریهای متابولیسمی یا غددی مثل دیابت و چاقی شدید ۱۲- عفونت مزمن کلیه و عفونتهای ادراری ۱۳- عدم تخلیه ادرار ۱۴- انجام شیمی درمانی

علایم:

- ۱- درد- دردشیدیداصلی ترین علامت است معمولاً ناگهانی و همراه با احساس فشار است. معمولاً در ناحیه پشت درست پایین دندن ها ظاهر می گردد و در طی چند ساعت یا چند روز- ناحیه درد از مسیر حرکتی سنگ از حالب به طرف کشاله ران پیروی میکند.
- ۲- تهوع و استفراغ های مکرر
- ۳- خون ادراری: لبه های تیز و کناره های ناصاف سنگ هنگام عبور از محل های تنگ دستگاه ادراری میتواند ایجاد خونریزی - سوزش در هنگام ادرار کردن خارش کند. ادرار ممکن است تیره یا کدر به نظر برسد.

به طور کلی سنگهای ادراری ۴ نوع هستند:

- ۱- کلسیمی- بیشترین نوع سنگ است ۸۰٪ سنگها حاوی کلسیم هستند. در بسیاری از افراد کلیه قادر به شستن کلسیم اضافی در ادرار هستند اما در بعضی دیگر کلسیم در داخل کلیه ها رسوب می کنند سپس این کلسیم همراه با سایر ترکیبات مخلوط شده و سنگ ها را ایجاد می کنند.

سنگ کلیه چیست :

سنگ ادراری یا همان سنگ ادراری یک توده بلوری شکل و سخت کاملاً شبیه به سنگ- معمولاً با حاشیه نامنظم و کنارهای تیز- است که از مواد داخل ادرار بوجود می آید. که نتیجه اندازه آن بزرگ میشود درز یک یا هر دو کلیه تشکیل میشود و گاهی به داخل حالبها انتقال می یابد اندازه آن بسیار متفاوت بوده و از اندازه یک دانه برنج تا بزرگی یک توپ کوچک- معمولاً به رنگ زرد یا قهوه ای- دیده میشود از مهمترین علایم سنگ کلیه درد است. در معمولاً شب ها شروع میشود و فردا از خواب بیدار میکندر درد غیرقابل تحمل است خانم هایی که زایمان کرده اند و بیمار سنگ کلیه هستند می گویند درد زایمان قابل مقایسه با سنگ کلیه نیست معمولاً در مردان شایعتر است.

علل ایجاد سنگ :

- ۱- دفع مقداری بیش از حد کلسیم از ادرار در اثر اختلال غده پاراتیرویید
- ۲- مصرف بیش از حد ویتامین ها و مکملهای دارویی
- ۳- نقرص (سنگهای اسیداوریکی)
- ۴- انسداد ادراری به هر دلیل
- ۵- کاهش حجم ادرار ناشی از کم آبی یا آب و هوای خشک
- ۶- رژیم غذایی نامناسب (مصرف بیش از حد کلسیم- مصرف



بیمارستان امام خمینی بناب

پمفت سنگهای ادراری

بیمارستان امام خمینی بناب



ریس علمی بخش: دکتر فضلی

سوپر وایز آموزشی: خانم بیرامی

تھیہ کنند: ستارزاده

تدوین: ۱۴۰۱

ویرایش: دوم

بازنگری: ۱۴۰۳

کد سند: PA-PHE-۹۴

۳- محدود کردن مصرف چای و قهوه و نوشابه زیرا کافین موجب از دست رفتن آب بدن میشود و به تشکیل سنگ کمک میکند.

۴- غذای کم نمک مصرف کنید و از مصرف شکر زیاد خود داری کنید.

۵- هر ۲ ساعت مثانه خود را تخلیه کنید.

۶- پیاده روی سرمهش و ورزش را فراموش نکنید.

۷- مصرف آجیل کم و محدود باشد

۸- با رعایت بهداشت فردی از بروز عفونت ادراری پیشگیری کنید

۹- از کرفس - اسفناج - وریواس کمتر استفاده کنید.

۱۰- ممکن است به شما توصیه شود مه از غذاهای خاصی بیشتر بیشتر استفاده نمایید و یکسری غذاهای دیگر را کمتر مصرف نمایید بعنوان مثال در سنگهای اسیداوریک فرد باید کمتر گوشت مصرف کند. زیرا گوشت در بدن تبدیل به اسیداوریک میشود بیز میتوان جهت جلوگیری از تشکیل سنگهای اسیداوریکی یا کلسیمی از ادرار استفاده شود.

۱۱- بعداز دفع سنگ - حفظ نشان دادن آن به دکتر آن به دکتر آن را نگه دارید و از پزشک در مورد نحوه پیشگیری از بروز سنگ سوال کنید.

۱۲- هنگام ادرار کردن از یک صافی ریز استفاده کنید.

منابع: کتاب درسنامه پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارت، تالیف جانیس ال. هینکل، ترجمه حجی محمد نوروزی، انتشارات اندیشه رفیع

شماره تلفن مستقیم اورژانس بیمارستان: ۰۴۱۳۷۷۶۴۳۳۱

۱- سنگ شکن بالمواج صوتی استفاده می کنند که براحتی ازبافت های بدن می گذرد و دارای قدرت کافی برای شکستن سنگ کلیه است. در این روش، سنگها به قطعات ریز شکسته و همراه با ادرار از مجاری ادراری دفع می شوند. این امواج بی خطرندوبیمار، آنها را حس نمکند.

۲- خارج کردن یا خرد کردن سنگ از طریق پوست اگر سنگ شکن کارساز نباشد یا سنگ خیلی بزرگ باشد، از این روش استفاده میشود در این روش، لوله نازکی به نفووسکوپ از طریق برش کوچکی که در ناحیه در پشت بیمار ایجاد شده وارد کلیه می شود. سپس با استفاده از آن، سنگ را خرد میکنند و سپس خارج می سازند.

۳- یورتروسکوپی: جراح در این روش، لوله تلسکوپ نازکی را به نام یوتروسکوپ از طریق مجرای ادراری به محل استقرار سنگ هدایت می کند و می کوشد تا با بهرگیری از این ابزار دقیق، سنگ را به طور کامل خارج سازد یا برای راحتی کار، ابتدا آن با استفاده از امواج صوت لیزر شکسته و خارج کند

۴- جراحی باز: جراح در این روش، برشی را در پهلوی بیمار ایجاد می کند و از این طریق بادسترسی به کلیه ها اقدام به خارج ساختن سنگ می نماید. این، آخرین گزینه برای درمان سنگ است و در موارد معدودی م مورد استفاده قرار می گیرد.

راههای پیشگیری از تشکیل سنگ :

۱- نوشیدن ۱۲ لیوان آب در روز و شب ۲ لیوان قبل از خواب.

۲- مصرف نوشیدنیهای لیمویی - زنجبلی - پرتقالی (اما در عین حال بهترین نوشیدنی آب است)

۲- سنگهای استرولیتی که ثانویه به بعضی عفونتهای ادراری ایجاد می شونند این سنگها حاوی منیزیم و آمونیاک می باشند (شاخ گوزنی)

۳- اسید اوریکی - زمانیکه ادرار خیلی اسیدی است ایجاد میشود باید مصرف گوشت در این افراد محدود شود.

۴- سیستینی - بسیار نادر میباشد بیشتر به صورت فamilی است و عامل ارث در تشکیل این سنگها نقش دارد سیستئین در ساختار عصب و عضله نقش دارد.

تشخیص : آزمایش ادرار - آزمایش خون - معاینات بالینی - عکس ساده ورنگی - سونوگرافی

درمان : با توجه به شدت بیماری پزشک اقدامات درمانی زیر را جهت بیمار برنامه ریزی می نماید

۱- مصرف داروهای مسکن

۲- نوشیدن مقادیر فراوان آب، در صورتی که تهوع و استفراغ وجود داشته باشد مایع درمانی یا سرم درمانی شروع میشود.

۳- جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته برای بررسی سنگ از نظر نوع، ترکیب و علل زمینه ای تشکیل سنگ

اما اگر در دخیلی شدید باشد، احتمالا سنگ، مجرای ادراری بیمار را مسدود کرده یا ینکه سنگ با یک عفونت ادراری هم زمان شده است. در این حالت از درمانهای زیر استفاده میشود.