

## پانکراتیت(التهاب پانکراس)



تهیه و تنظیم

رئیس علمی بخش داخلی: دکتر مجیدی

سوپر واچر آموزشی: بیرامی

سرپرستار بخش: ش - صمدزاده

رابط آموزشی: لیلا جلالی

تاریخ تدوین: ۱۴۰۰

ویرایش: دوم

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴

کد سند: PA-PHE-۵۶

### پانکراتیت:

به التهاب پانکراس که یک اختلال جدی است و به دوشکل حاد و مزمن دیده می شود پانکراتیت گفته می شود. یک اورژانس طبی است که با خطرات زیاد، مشکلات و عوارض تهدید کننده زندگی و مرگ و میر همراه است.

### علل:

- مهم ترین علت وجود سنگ های صفرایی است.

- مصرف طولانی مدت الکل

- عفونت باکتریایی و ویروسی

- صدمات غیرنحوی به شکم

- مصرف بی رویه داروهای کورتون

- قرص های ضدبارداری از سایر علل ایجاد آن می باشد.

### أنواع پانکراتیت:

حداکفیف: به وسیله التهاب محدودیه پانکراس مشخص می شود و در طی ۶ ماه به حالت عادی باز می گردد. رایین مدت بیمار واقع ناخوش می باشد.

حداکدید: بافت پانکراس از بین میروند.

مزمن: به مرور زمان بافت پانکراس تخریب می شود.

### علائم:

حاد: در دشیدشکمی که چندین ساعت پس از خوردن یک غذای سنگین یا الکل احساس می شود به طوری که باشربت معده نیز بهبود نمی یابد.

- سفتی عضلات شکم

- تهوع و استفراغ

- تب

- زردی، افت فشارخون


### مزمن:

- حملات مکرر در در پشت و قسمت فوقانی شکم که حتی باداروی مخدوشکین نمی یابد.

- کاهش وزن قابل توجه

- مدفوع بدبو، کف آسوده ای او دهای مقادیر زیادی چربی

- زردی پوست که به علت سنگ صفرایی ایجاد می گردد.



-رعایت بهداشت دهان و دندان در زمانی که بیمار چیزی نمیخورد

-پوزیشن نیمه نشسته جهت جلوگیری از فشاریه دیافراگم

**در صورت علائم زیر حتماً به پزشکتان مراجعه نمایید:**

-تب بالای ۳۸ درجه

-زردی پوست

-کاهش مداوم وزن

-انقباطات عضلات شکم

با آرزوی سلامتی و بهبودی برای شما سرور گرامی

در صورت داشتن هرگونه مشکل پس از ترخیص

میتوانید با شماره تلفن زیر تماس بگیرید

شماره تماس بیمارستان

۰۴۱-۳۷۷۶۳۰۹۰

داخلی ۳۵۶

منبع: درسنامه داخلی جراحی بروز و سودارت

## توصیه ها:

-صرف الکل و مواد کافئین دارممنوع می باشد.

-خوردن غذاهای پرادویه و تندرمنوع می باشد.

-تغییر پوزیشن برای جلوگیری از تجمع ترشحات در ریه

-استراحت در تخت تازمان مشخص شده

-رعایت رژیم کم چرب ولی به دفعات مکرر

ممنوعیت استفاده از نمک سبزیجات پرتقال نارنگی

توصیه به استفاده از عسل لیموترش و سیب رنده شده مخلوط و کم کم استفاده شود.

سوپ میکس شده و پوره سیب زمینی استفاده شود.

گوشت مرغ و گوشت پرنده مجاز می باشد.



درمان:

-دادن استراحت کامل به لوله گوارش و نخوردن هیچ گونه

غذای مایعات

-بستری در بیمارستان

-برقراری سرم تراپی

-کنترل از لحاظ عفونت و دادن مسکن و داروهای آنتی اسید

-در صورت نیاز عمل کیسه فرا انجام میگیرد.

-بعد از کنترل در درزیم غذاهای زودهضم و کم چرب شروع

میشود و عده های کم حجم و متعدد قابل تحمل تریه بیمارداده

میشود. و به مرور به بیمار اجازه غذا خوردن داده میشود.

