



### رناژل یاسولامر:

کمک به پایین آوردن فسفر می کند. همچنین با اسیدهای صفراوی باند می شود و بدین ترتیب سطح کلسترول خون پایین می آید.

عوارض: سردرد، تهوع، استفراغ، اسهال و کاهش فشار خون

### مراقبت و توجهات:

- رعایت رژیم غذایی کم فسفر

- این دارو با داروهای ضد تشنج، آنتی آریتمی، وارفارین و سیپروفلوکساسین تداخل دارد. فاصله مصرف رناژل با این داروها حداقل باید ۱ تا ۳ ساعت باشد.

- رناژل باید همراه غذا مصرف شود و قرص ها به طور کامل بلعیده شود.

- اگر فراموش کردید رناژل را مصرف کنید، رناژل فراموش شده حذف شود از ۲ برابر کردن دارو خودداری نمایید.



### کلسیتریول یا روکاترول:

در درمان کاهش سطح کلسیم خون استفاده می شود این دارو جذب کلسیم روده را افزایش می دهد و ترشح هورمون پاراتیروئید شما را کم می کند.

عوارض: سردرد، بیخوابی، ضعف، تهوع، یبوست، طعم فلزدر دهان، خشکی دهان، بی اشتهاپی

### مراقبت و توجهات:

- دارو را می توان همراه با غذا یا معده خالی مصرف کرد.

- دارو را با ظرف مقاوم به نور و در محل خشک و درجه حرارت ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری نمایید.

- از شکستن، خرد کردن یا جویدن کپسول خودداری کنید.



بیمارستان امام خمینی بناب

## داروهای رایج دیالیز



رابط آموزشی: خانم سلیمان زاده

با تایید: آقای دکتر روحی

تدوین: ۱۴۰۳

کد سند: PA-PHE-144



### نفرویت :

قرص نفروویت به عنوان یک مولتی ویتامین تخصصی، برای پیشگیری از کمبود مواد مغذی که ممکن است به دلیل محدودیت در رژیم غذایی و بی اشتهاهی در افراد مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی رخ دهد، مفید می باشد.

-روزانه یک عدد مصرف می گردد.

### منابع:

راهنمای تغذیه برای بیماران همو دیالیز

نوشته: علی عبدی

شماره تلفن: ۳۷۷۶۴۷۷۷



### ونوفر :

از ترکیبات آهن می باشد، که کمک به درمان کم خونی می نماید.

**روش استعمال:** به صورت وریدی می باشد، که توسط پرستار بخش دیالیز به همراه سرم تزریق می شود.

**عوارض:** افت فشار خون، سردی، تهوع، استفراغ، درد مفاصل، درد

عضلانی، سرگیجه، درد قفسه سینه، احساس طعم فلزی در دهان

### مراقبت و توجهات:

-در صورت بروز عوارض حتما اطلاع دهید

-نیاز به نگهداری در یخچال ندارد

-باهیچ دارویی نباید مخلوط شود.



### کربنات کلسیم :

قرص کربنات کلسیم به عنوان پایین آورنده فسفر و یا کمک به افزایش کلسیم مصرف می شود.

**عوارض:** یبوست، تهوع، استفراغ، خشکی دهان، دل درد، تشنگی و تکرر ادرار

### مراقبت و توجهات:

-این دارو اگر برای اصلاح کلسیم مصرف شود، یک ساعت بعد از غذا میل می شود اگر با هدف اصلاح فسفر باشد، در وسط غذا میل می شود.

-در صورت مصرف آب فراوان حین بلع دارو می توانید دارو را پودر نموده و بر روی غذای خود ریخته و مصرف نمایید.