



بیمارستان امام خمینی بناب

بیمارستان امام خمینی بناب

TURP برش پرستات از طریق

مجرای ادراری



تهیه و تنظیم:

با راهنمایی آقای دکتر بابایی

شمسی اسفندیاری (رابط آموزشی بخش جراحی)

هاجر بیرامی (آموزش سلامت)

تاریخ تدوین: 1400

تاریخ بازنگری: 1402

کد سند: PA-PHE-30

TURP به معنی برش پروستات از طریق مجرای

ادراری و بدون شکاف جراحی باز میباشد.

در این روش با بیهوشی عمومی یا بی حسی نخاعی

و با عبور دوربین بداخل مجرا قسمتی از پروستات را که

باعث انسداد مجرا شده تراش میدهند.

توصیه های قبل از عمل:

در صورت وجود عفونت های ادراری باید با انجام آزمایش

و خوردن آنتی بیوتیک کاملا عفونت ادراری را کنترل

کرده و در صورت مصرف داروهای رقیق کننده خون از

جمله آسپرین و وارفارین باید یک هفته قبل از عمل با

نظر پزشک دارو قطع گردد.

عمل جراحی بابتی حسی نخاعی یا بیهوشی عمومی

انجام میشود.

بعد از عمل سوند مجرا برای شست و شو و جلوگیری از

لخته شدن ادرار تعبیه میشود.



بعد از عمل با سوند مجرا که سرم شستشو به آن وصل

میباشد از اتاق عمل خارج شده و به بخش منتقل میشوند.

مراقبتهای بعد از عمل:

ساعت ها و روزهای اول ممکن است خونریزی داشته باشید

و رنگ ادرار، قرمز یا صورتی خواهد بود که شستشوی مثانه با

سرم شستشو کمک کننده میباشد. باید مراقب باشید که

سوند مجرا تحت کشش قرار نگیرد و کیسه ادرار در پایین

ترین سطح در حالت آویزان قرار بگیرد.

مراقبت های پس از ترخیص:

کم کم فعالیت عادی را شروع کنید، از بلند کردن وسایل

بیش از ده کیلو گرم تا شش هفته خودداری کنید زیرا

ممکن است سبب ایجاد خونریزی از پروستات شود.

سه هفته پس از جراحی میتوانید فعالیت جنسی داشته

باشید.

استحمام:

شما میتوانید طبق روزهای عادی حمام کرده و دوش بگیرید.

مصرف دارو:

موقع ترک بیمارستان ممکن است برای شما دارو تجویز شود که طبق دستور پزشک جراح آنها را استفاده نمایید.

آسپرین و داروهای ضد درد مفاصل، خطر خونریزی پس از جراحی را زیاد میکند اگر لازم به ادامه مصرف این داروها باشد با پزشک خود مشورت کنید.

کنترل ادرار در اوایل خصوصاً طی چند هفته بعد از عمل برای شما مشکل خواهد بود حتی ممکن است دچار تکرر ادرار شوید.

هیچگونه برش روی پوست وجود ندارد که احتیاج به ترمیم داشته باشد اما پروستات دارای زخم بوده و چند هفته وقت لازم است تا زخمهایش التیام یابد.

نوشیدن آب و مایعات فراوان توصیه میشود.

در صورت داشتن هر گونه سوال میتوانید با رابط آموزشی بخش تماس بگیرید

37769927

منبع: داخلی جراحی برونر و سودارث