



فلوفنازین



تهیه کنندگان:

خانم مولایی رابط آموزشی

سرپرستار بخش: خانم میزانیپور

سوپروایزر آموزش سلامت: خانم بیرامی

با تایید: دکتر رهنمون روانپزشک

تدوین: ۱۴۰۰

ویرایش: دوم

بازنگری: ۱۴۰۴

منبع: درسنامه جامع روان باربارا بوئر

کد سند: PA-PHE-۷۲

فلوفنازین با نام تجاری مودیکیت یک داروی آنتی

سایکوتیک می باشد که برای درمان اسکیزوفرنی و علائم

سایکوتیک مثل: توهم، هذیان و بد بینی استفاده میشود

اشکال دارویی فلوفنازین بصورت قرص ۱/۵ میلی گرم و

آمپول ۲۵ میلی گرم (تزریق عضلانی) می باشد. فلوفنازین

تزریقی طولانی اثر یا همان آمپول فلوفنازین ، برای

نگهداری وضعیت علائم اسکیزوفرنی که با داروی الانزپین

تسکین یافته است استفاده میشود . فلوفنازین تزریقی

طولانی اثر ، به آرامی فلوفنازین را را در بدن آزاد میکند.

افراد بیمار این دارو را باید هر ۲-۵ هفته یک بار تزریق

کنند. مزیت اصلی آمپول فلوفنازین این است که به صورت

یک انبار عمل کرده و آرام آرام دارو را در بدن آزاد می کند

در نتیجه نیازی نیست که هر روز یک قرص خورده شود.

عوارض مصرف فلوفنازین:

عمده ترین عوارض جانبی این دارو عوارض اکستراپرامیدال

میباشد. از عوارض شایع دیگر احساس خواب آلودگی، سر

گیجه، تاری دید ، خشکی دهان، لرز و حرکات عضلانی

غیر قابل کنترل، بیقراری و مشکلات حرکتی، سردرد، تغییر

در وزن ، گرفتگی بینی ، خواب دشوار، احساس آشفستگی و

سردرگمی ، مشکلات جنسی ، مشکلات قاعدگی ، ضربان

قلب سریع ، کاهش توانایی ذهنی ، ناراحتی معده ، یبوست

و مشکل دفع و ادرار میباشد.

نکته مهم: اگر تجربه علائمی مانند سفتی عضلات تب

بسیار بالا ، احساس گیجی ، ضربان قلب سریع و تعریق

داشتید به پزشک خود اطلاع دهید این نشانه ها میتواند

نشانه ای از یک بیماری نادر شناخته شده به نام سندرم

نورو لپتیک بد خیم باشد.

عوارض مصرف بیش از حد فلوفنازین (مسمومیت با

فلوفنازین):

این دارو را بیش از دوز تجویز شده توسط پزشک مصرف

نکنید . اگر احساس کردید که فردی دچار مسمومیت شده

است و علائمی مانند از دست دادن هوشیاری ، تشنج ،

ضربان قلب سریع یا نامنظم، تنفس آهسته یا کم عمق و

یا تنگی نفس ، غش و ضعف (از حال رفتن) در او دیدید

سریعا با اورژانس تماس بگیرید.

مصرف فلوفنازین در بارداری و شیردهی:

برای مصرف فلوفنازین در بارداری حتما با پزشک معالج

مشورت کنید ممکن است برای جنین خطرناک

باشد. فلوفنازین در شیر مادر ترشح میشود باید با احتیاط

مصرف شود.

موارد منع مصرف فلوفنازین:

در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد کبدی ، کاهش فعالیت مغز استخوان (به دلیل احتمال آگرانولوسیتوز)، آسیب های مغزی یا ضعف CNS (به دلیل تضعیف اضافی CNS) منع مصرف دارد.

و در بیماری های تنفسی ، صرع و سایر اختلالات تشنجی ، گلوگوم ، هیپرتروفی پروستات ، بیماران قلبی عروقی شدید، زخم معده و کمی کلسیم خون باید با احتیاط مصرف گردد.

فرم تزریقی فلوفنازین در بیماران دچار آسم و آلرژی به سولفیت با احتیاط مصرف گردد..بد



بدون دستور پزشک نباید مصرف فلوفنازین قطع گردد مخصوصا کسانی که آن را به مدت طولانی مصرف کرده اند چون باید به دستور پزشک و به تدریج دوز آن کم شود

آموزش های پرستاری به بیمار:

۱- به بیمار تذکر دهید تا شناخته شدن واکنش به دارو از رانندگی یا سایر فعالیت های خطرناک اجتناب کند.

۲- به بیمار توصیه کنید رژیم دوز مصرفی را تغییر ندهد یا آن را به طور ناگهانی قطع نکند.

۳- به بیمار تذکر دهید این دارو را به فرد دیگری ندهد.

۴- در صورت بروز عوارض بیمار باید پزشک را فوراً مطلع سازد.

۵- بیمار را به مصرف کافی غذا و مایعات تشویق نمایید از آنجایی که عامل پیشگیری کننده ای برای یبوست و خشکی مخاط دهان است.

۶- برای پیشگیری از عوارض گوارشی همراه غذا مصرف شود.

۷- اگر سایر داروهای خواب آور مصرف میکند حتماً به پزشک اطلاع دهید.

۸- بیمار ممکن است قادر به تعدیل حرارت زیاد محیط نباشد به وی توصیه کنید به خاطر احتمال نقص تنظیم حرارت و سرما و گرما احتیاط کند.

۹- مادامی که بیمار تحت درمان با فلوفنازین می باشد از مصرف الکل باید اجتناب شود.

۱۰- دارو را از نور دور نگه دارید اندکی تغییر رنگ دارو به زردی

زردی طبیعی است.

۱۱- با ادامه درمان معمولاً خواب آلودگی کاهش می یابد.

۱۲- اثرات درمانی کامل ممکن است ۶ هفته طول بکشد.

پس از درمان بلند مدت، دارو را به طور ناگهانی قطع نکنید.



منبع

کاپلان و سادوک ،چکیده روان پزشکی بالینی ،نصرت الله

پورافکاری.تهران:آزاده

