



بیمارستان امام خمینی بناب

هالوپریدول



گروه هدف: بیمار و خانواده

(بخش روانپزشکی)

تهیه و تایید:

خانم ملایی: پرستار بخش روان

رئیس علمی بخش: دکتر رهنمون

تدوین: ۱۴۰۰

ویرایش: دوم

بازنگری: ۱۴۰۴

کد سند: ۸۳-PA-PHE

هالوپریدول (Haloperidol):

موارد مصرف: هالوپریدول از دسته داروهای ضد

سایکوزمی باشد. از نوع تزریقی آن در موارد پرخاشگری

شدید استفاده می شود. این دارو برای کنترل علائم بسیاری از

اختلالات از جمله اسکیزوفرنی، اختلال دو قطبی مورد

استفاده قرار میگیرد. این دارو در کوتاه نمودن دوره بیماری و

کم کردن علائم و جلوگیری از حملات بعدی موثر می باشد.

نام تجاری و اشکال دارویی:

نام تجاری هالدول (Haldol) می باشد. هالوپریدول به صورت

قرص ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ میلی گرمی، آمپول ۵ میلی گرمی، قطره در

دسترس می باشد.

موارد منع مصرف:

* در کودکان جز در موارد خاص

* بانوان محترم باید در صورت بارداری به پزشک اطلاع

دهند.

* بانوان همچنین در زمان شیردهی، قبل از مصرف دارو با

پزشک مشورت کنند.

عوارض جانبی:

هالوپریدول مانند بسیاری از داروهای دیگر علاوه بر مزایای درمانی

ممکن است عوارضی هم داشته باشد که این عوارض همیشه و در

تمامی افراد ظاهر نمی شود و اگر هم بروز پیدا کند همیشه خطرناک

و جدی نیستند. روانپزشک زمانی این دارو را تجویز می کند که منافع

آن ها بسیار بیشتر از عوارضش باشد.

عوارض جانبی دارو تغییرات فیزیولوژیک ماندگار و دایمی نیستند،

بلکه بعثت حضور فعال دارو در بدن، موقتی بوده و نشان دهنده تاثیر

دارو نیز می باشد. پس اری از عوارض دارویی قابل درمان هستند و

نیازی به قطع دارو نیست ولی در اولین فرصت باید با پزشک

مشورت شود.

* ممکن است در برخی از افراد اشکال در بلع ایجاد شود.

* در بعضی بیماران انقباض و گرفتگی عضلات که به صورت کج شدن

گردن و ستون فقرات به همراه درد بروز می کند.

* اشکال در صحبت کردن، اشکال در بلع، کشیدن پا به زمین به هنگام راه

رفتن، سختی عضلات ساق پا و بازوها ممکن است به وجود بیاید.

* احتباس ادرار و مدفوع، تاری دید، افزایش وزن، خفواب آلودگی، واکنش

های حساس تی پوستی، یبوست و کاهش میل جنسی از عوارض احتمالی

تداخل هالوپریدول با سایر دارو ها:

- * مصرف بعضی از داروها به همراه هالوپریدول باعث کاهش یا افزایش اثر دارو می شود. لذا الزم است قبل از مصرف هفر گونه دارو با پزشک مشورت کند.
- * مصرف همزمان هالوپریدول با الکل، برخی داروهای ضد درد، داروهای مخدر و آرام بخش ها موجب خواب آلودگی بیش از حد، تنفس نامناسب و افت فشار خون می شود.



نکات قابل توجه در مصرف دارو:

- * این دارو باید با نظر پزشک مصرف شود. از افزایش و کاهش و یا قطع آن بدون نظر پزشک خودداری شود.
- * دارو میتواند همراه با غذا و یا با معده خالی و یک لیوان آب میل شود. در صورت بروز مشکلات گوارشی بهتر است همراه غذا مصرف شود.
- * هنگام رانندگی یا انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارد، احتیاط کند. زیرا با مصرف دارو امکان بروز خواب آلودگی وجود دارد .
- * از تماس محلول های خوراکی هالوپریدول با پوست جلوگیری نماید زیرا می تواند باعث واکنش های پوستی شود.
- * از قرار گرفتن ب ش از حد در برابر آفتاب خودداری کند و از لوسیون های محافظ نور خورشید، عینک آفتابی و پوشش کامل استفاده کند.



- * کم شدن بزاق به خصوص در بیماران سالمند باعث خشکی دهان، پوسیدگی دندان و بیمارهای لثه و دهان میشود، بنابراین حفظ بهداشت دهان، مسواک زدن و استفاده از نخ دندان توصیه میشود.
- * برای کاهش یبوست ناشی از دارو، به مقدار کافی مایعات، میوه و سبزی مصرف نماید و تحرک و فعالیت های ورزشی خود را افزایش دهد.
- * در صورت فراموش کردن یک دوز دارو از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری کند.
- * دوره درمان را کامل کند، برای رسیدن به اثرات درمانی مناسب ممکن است هفته ها زمان لازم باشد.
- * مصرف دارو را زودتر از زمان مقرر و بدون نظر پزشک قطع نکند .
- در چه صورتی باید به پزشک مراجعه کنید؟ در صورت بروز تب، سفت شدن عضلات، تفتنکر غیر طبیعی، سردرگمی و گیجی، تند شدن و یا نامنظم شدن ضربان قلب سریعاً به پزشک معالج مراجعه کند.

• منابع: کتاب دارونامه رسمی ایران- مولف: وزارت بهداشت، درمان

و آموزش پزشکی - انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شماره تلفن بخش روان: ۰۴۱ ۳۷۷۶۳۰۹۰ داخلی ۲۰۵